

ДОСТИМ (DOSTIM)

Достим (инъекция учун суспензия) ветеринария учун дори воситаси. Турли хил бактериал ва вирусли юқумли касалликларни комплекс даволаш ва олдини олишда, кичик уй ва қишлоқ хўжалик ҳайвонларига қўлланилади.

ТАРКИБИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ШАКЛИ:

- 0,2% тўқима гидролизати

- 0,5% иммобиллашган ва тозаланган дрожжали полисахарид

Ранги оч сариқ, енгил специфик ҳидга эга суспензия. Шишали ампула ва флаконларда ишлаб чиқарилади.

ФАРМАКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Достимнинг иммунокорректорловчи таъсири асосан иммунитетнинг ҳужайра ва гуморал тизимини тикланишига йўналтирилган. Препарат таъсири остида фагоцитоз кучайиб, фагоцитларнинг киллерлик ва ҳазм қилувчи хоссалари ортади. Жигар ва альвеоляр макрофагларнинг антитоксик фаоллиги ортади. Достим иммунитетнинг Т-тизимига таъсир этиши натижасида вирус билан зарарланган ҳужайралардаги вирусларни нобуд қилишга йўналтирилган. Препарат цитотоксик Т-лимфоцитларнинг сони ва фаоллигини оширади. Шу билан бирга, препарат организмда зардобли ва секретор антитаналар ишлаб чиқарилишини кучайтиради.

Қўллашга кўрсатмалар:

Турли хил микробли ва вирус этиологияли юқумли касалликларнинг профилактикаси ва комплекс даволашда кичик уй ва қишлоқ хўжалик ҳайвонларига қўлланилади. Гинекологик патологияларда, шунингдек комплекс терапия таркибиде маститларни даволашда, кўзилар ва бузоқларнинг ошқозон-ичак, нафас олиш тизимининг бактериал ва вирус табиатли юқумли касалликларида қўлланилади. Парвовирусли, коронавирусли ва ротавирусли энтеритларда, вирусли трахеобронхитда ("вольерли йўтал"), аденовирусли гепатитда, гинекологик касалликларда, отитларда, циститларда, нефритларнинг турли этиологияларида, панлейкопениеда, вирусли ринотрахеитда, калицивироз ва герпесда, стресс ҳолатларида, хирургик даволашдан кейинги регенерацияларни яхшилашда, сабаби (этиологияси) аниқланмаган, ноаниқ сурункали касалликларни даволашда ёрдам беради. **Касалликларнинг оғир патологик кечишида (юқори тана ҳароратида) препарат дозаси 25-30% гача** камайтириш тавсия этилади (дозани 3-4 барабар камайтириш керак). Микроб этиологияли касалликларнинг даволанишида Достимни антибиотиклар билан биргаликда қўллаш даволаш самарадор бўлади. Янги туғиладиган ҳайвонлар ҳаётининг биринчи ҳафталаарида бўлиши мумкин бўлган ошқозон-ичак ва респиратор касалликларининг олдини олиш учун, Достимни оналарига туғишдан 30 кун олдин бир марта юборилади.

ДОЗАЛАР ВА Қўллаш усули:

Препарат асептика ва антисептика қоидаларига риоя этган ҳолда бир кунда бир марта мушак орасига юборилади. Препаратни қўллашдан олдин флаконни чайқатиш тавсия этилади. Жами 3-5 та инъекция (касаллик оғирлигига қараб) қилинади, инъекциялар орасидаги интервал 2-3 кунни ташкил этади. Сурункали касалликларни даволашда инъекциялар орасидаги интервал 5-6 кун. Ҳайвоннинг вазига нисбатан Достимнинг дозалари қуйидагича:

Ҳайвоннинг вази	Достим дозалари
0,1–1 кг	0,1–0,4 мл
1–5 кг	0,4–0,6 мл
5–10 кг	0,6–1,0 мл
10–20 кг	1,0–2,0 мл
20–40 кг	2,0–3,0 мл
40–60 кг	3,0–4,0 мл
60–100 кг	4,0–5,0 мл
100–200 кг	5,0–8,0 мл
200 кгдан юқори	8,0–10,0 мл

НОЖЎА ТАЪСИРИ:

Гиперсезувчан ҳайвонларда аллергик реакциялар пайдо бўлиши мумкин. Дозаси ва қўллаш усули қоидага биноан амалга оширилса, ноҳўя таъсирлар кузатилмайди. Тери остига юнатилганда маҳаллий шиш ёки абсцесс кузатилиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар:

Препаратга юқори индивидуал сезувчанликда. Гўшт ейдиган ҳайвонларда ўлат касаллигининг нерв босқичида қўлланилмайди.

МАХСУС Кўрсатмалар:

Достимни қўлланилгандан сўнг, қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг гўшти, сути ва сўйилиши чегараланмайди. Флакон очилгандан сўнг дори воситаси **24 соат давомида** ишлатилиши лозим.

САҚЛАШ ШАРОИТЛАРИ:

Қуруқ ва қуёшдан ҳимояланган жойда, +2°C дан +40°C гача бўлган ҳароратда.

Сақлаш муддати — 2 йил.

Ишлаб чиқарувчи: МЧЖ "BIBINOR" ҚҚ

Тошкент тумани, Келес шаҳри, Фитрат-2А.

Тел: +998995203040

Веб-сайт: www.bibinor.com

Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган.



BIBINOR
Pharmaceuticals
SINCE 1999

ДОСТИМ (DOSTIM)

Достим (суспензия для инъекций) ветеринарное лекарственное средство. Оказывает иммуностимулирующее действие, преимущественно направленное на активацию клеточно-опосредованных реакций иммунной системы для мелких домашних, хозяйственных и диких животных.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

-тканевой гидролизат-2 мг

-иммобилизованный и очищенный дрожжевой полисахарид-500мкг

Суспензия светло-жёлтого цвета, имеет слабый специфический запах. Выпускается в стеклянных флаконах.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Достим оказывает иммунокорректирующее действие, направленное на восстановление клеточного и гуморального звена иммунной системы. Под влиянием препарата усиливается фагоцитоз, киллерные и переваривающие функции фагоцитов. Повышается антитоксическая активность печеночных и альвеолярных макрофагов. Достим воздействует на Т-систему иммунитета, увеличивая количество и активность цитотоксических Т-лимфоцитов, направленных на уничтожение инфицированных вирусом клеток. Вместе с этим, препарат усиливает выработку сывороточных и секреторных антител в организме.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Назначают мелким домашним, сельскохозяйственным и диким животным для профилактики и в комплексной терапии различных инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии. При гинекологических патологиях, а также при лечении маститов, в составе комплексной терапии при инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы бактериальной и вирусной этиологии. При парвовирусном, коронавирусном и ротавирусном энтеритах, вирусном трахеобронхите («вольерный кашель»), аденовирусном гепатите, отитах, циститах, нефритах различной этиологии. При панлейкопении, вирусном ринотрахеите, калицивирозе и герпесе, при стрессе, для улучшения регенеративной функции организма после хирургических вмешательств. Может быть эффективен при лечении хронических заболеваний неясной этиологией.

В случаях тяжелых патологических состояний (при высокой температуре организма) дозу препарата рекомендуется снизить до 25-30% (необходимо снизить дозу в 3-4 раза). При лечении заболеваний микробной этиологии Достим эффективнее применять на фоне антибиотикотерапии. Для профилактики желудочно-кишечных и респираторных заболеваний молодняка в первые недели жизни Достим вводят матерям однократно за 30 дней до родов.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят один раз в день внутримышечно с соблюдением правил асептики и антисептики. Перед использованием флакон с препаратом рекомендуется встряхнуть. Всего делают 3-5 инъекций (в зависимости от тяжести заболевания), интервал между ними составляет 2-3 дней. При лечении хронических заболеваний интервал между введениями 5-6. В зависимости от веса животного, дозы Достима следующие:

Масса животного	Доза инъекции
0,1–1 кг	0,1–0,4 мл
1–5 кг	0,4–0,6 мл
5–10 кг	0,6–1,0 мл
10–20 кг	1,0–2,0 мл
20–40 кг	2,0–3,0 мл
40–60 кг	3,0–4,0 мл
60–100 кг	4,0–5,0 мл
100–200 кг	5,0–8,0 мл
более 200 кг	8,0–10,0 мл

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

У гиперчувствительных животных возможны аллергические реакции. При правильном использовании и дозировке побочные явления, как правило, не наблюдаются. При введении препарата подкожно, может наблюдаться отёк на месте введения препарата или абсцесс.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость животного к компонентам препарата. Запрещается применять при нервной стадии чумы плотоядных.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Сроки убоя сельскохозяйственных животных на мясо и молоко после применения Достима не ограничивается.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом, защищённом от света месте при температуре от +2 °С до +40 °С.

Срок годности - 3 года.

Производитель: СП ООО «BIBINOR»
Ташкентский р-й, г, Келес, ул Фитрат-2А.

Тел: +998995203040

Веб-сайт: www.bibinor.com

Произведено в Узбекистане



BIBINOR
Pharmaceuticals
SINCE 1999