

ИММУНОПАРАЗИТАН (Immunoparazitan)

Иммунопаразитан (инъекция учун суспензия) паразитар касалликларни олдини олиш ва даволашда ёрдам берувчи ветеринар дори воситаси.

ТАРКИБИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ШАКЛИ

Препарат кимёвий модификацияланган липопротеинлар ва полисахаридларнинг комплексидан ташкил топган. Специфик ҳидли, оч сариқ рангли ёки оч малла рангли суспензия.

1 мл препарат таркибда: полисахаридлар 0,05 мг, оқсил 20 мг мавжуд.

Сақланганда чўкма ҳосил бўлади. Чайқатганда чўкма эйилади. Шишали флаконларда 10, 50, 100 ва 200 мл дан ишлаб чиқарилади.

ФАРМАКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Иммунопаразитан трематодаларга, гижжаларга, сўна куртларига ва бошқаларга ҳалокатли таъсир этади. Эктопаразитларга (ташқи паразитларга), иммунитет системасига алоқаси бўлмаган (бурга, кана ва бошқалар) га таъсир этмайди. Препарат таркибига кирувчи липопротеинлар ва полисахаридлар организмнинг паразит ҳимоясига жавобгар иммунокомпетент ҳужайралар специфик клонларининг фаоллашуви орқали иммунитетнинг макрофаглар ва В-ҳужайра тизимига таъсир этади. Натижада ҳайвон организмда жойлашган паразит атрофида иммунологик реакция ҳосил бўлиши орқали паразит нобуд бўлади. Иммун тизимни доимий фаоллаштириш орқали паразитларга билвосита таъсир, Иммунопаразитанни шу касалликларнинг профилактикасида қўллашга имкон беради. Иссиқ қонли ҳайвонлар учун Иммунопаразитан жуда кам токсикликка эга. Терапевтик дозаларда мутаген, сенсбилянувчи, эмбриотоксик ва тератоген таъсирга эга эмас.

Қўллашга кўрсатмалар

Иммунопаразитан кавш қайтарувчи ҳайвонларда, отларда ҳамда ит ва мушукларда эхинококкоз, фасциолёз, дикроцелиоз, гиподерматоз, демодекоз, эдемагенозда, саркоптоз давоси ва профилактикасида қўлланилади. Замбуруғ касалликларини профилактикаси ҳамда даволанишида ҳам яхши натижа бериши мумкин.

ДОЗАЛАР ВА Қўллаш усули

Фойдаланишдан олдин препаратни чайқатиш лозим. Мушак орасига юборилади. Қишлоқ хўжалик ҳайвонлари — отларга, йирик ва майда шохли моллар саркоптоидоз, демодекоз, гиподерматоз, фасциолёз ва эхинококкозда 5–7 кунлик интервал билан 2–3 та инъекция (инвазиянинг оғирлигига қараб) ҳайвоннинг вазни бўйича қуйидаги ошувчан дозаларда қилинади:

Инъекция тартиб рақами	Ҳайвон вазни (кг) / Препарат дозаси (мл)					
	2 кг гача	2–5 кг	5–10 кг	10–50 кг	50–100 кг	100 кг дан ортиқ
1	0,2	0,4	0,6	1,0	1,5	2,0
2	0,4	0,6	0,8	1,2	2,0	2,5
3	0,6	0,8	1,0	1,5	2,5	3,0

Фасциолёзга қарши ишлов январдан апрелгача, гиподерматозга қарши — август охири сентябрда ўтказилади. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг саркоптоидозлар, демодекоз, гиподерматоз, эхинококкоз ва фасциолёз профилактикасида препарат 2 марта 14–15 кунлик интервал билан инъекция қилинади. Кичик уй ҳайвонлари — ит ва мушукларга терапевтик мақсадда эхинококкоз, демодекоз, саркоптоз, нотодерозда 4–5 кунлик интервал билан 3–5 инъекция (инвазиянинг оғирлигига қараб) қилинади. Касаллик кўп жойга тарқалган ҳолларда препарат дозасини 2 марта камайтириш, инъекция сонини эса 1 тага ошириш тавсия этилади (бунда инъекциялар орасидаги интервал ўзгармайди ва 4–5 кунлигича қолади).

НОЖЎА ТАЪСИРИ

Гиперсезувчан ҳайвонларда аллергик реакциялар бўлиши мумкин. Дозаси ва қўллаш усули қоидага биноан амалга оширилса, ножўа таъсирлар кузатилмайди.

ҚАРШИ КўРСАТМАЛАР

Индивидуал сезувчанлик.

МАХСУС КўРСАТМАЛАР

Иммунопаразитан қўлланилгандан сўнг, қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг гўштга сўйилиши чегараланмайди. Иммунопаразитанни **2–4 йил давомида** систематик тарзда қўлланилиши паразитар инвазия ўчоғининг кескин камайишига олиб келиши мумкин. инвазии в очаге.

САҚЛАШ ШАРОИТЛАРИ:

Қуруқ ва қуёшдан ҳимояланган жойда, +2°С дан +40°С гача бўлган ҳароратда. Сақлаш муддати — 2 йил.

Ишлаб чиқарувчи: **МЧЖ “BIBINOR” ҚК**
Тошкент тумани, Келес шаҳри, Фитрат-2А.
Тел: +998995203040

Веб-сайт: www.bibinor.com

Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган.



BIBINOR
Pharmaceuticals
SINCE 1999

ИММУНОПАРАЗИТАН (Immunoparazitan)

Иммунопаразитан (суспензия для инъекций) ветеринарный препарат, который помогает в лечении и профилактике паразитарных заболеваний у животных

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

Препарат содержит химически модифицированный комплекс липопротеинов и полисахаридов. Светло-серая или бежевая суспензия, с незначительным специфическим запахом.

1 мл препарата содержит:

- полисахариды 500 мкг
- тканевой гидролизат 1 мг.

При хранении образуется осадок, который легко разбивается при встряхивании. В стеклянных флаконах выпускается по 10, 50, 100 и 200мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Иммунопаразитан оказывает губительное действие на трематод, гельминтов, клещей, личинок и т.д. Не эффективен для эктопаразитов (наружных), не доступных для системы иммунитета (блох, иксодовых клещей и т.д.). Комплекс липопротеинов и полисахаридов, входящий в состав препарата, воздействует на макрофагальную и Вклеточную системы иммунитета, что приводит к активации специфических клонов иммунокомпетентных клеток, ответственных за противопаразитарную защиту организма. **В результате вокруг паразита, находящегося в организме животного, развивается иммунная реакция, следствием которой является гибель паразита.**

Опосредованное воздействие на паразитов посредством долгосрочной активации системы иммунитета позволяет использовать Иммунопаразитан для профилактики указанных заболеваний. Иммунопаразитан очень малотоксичен для теплокровных животных. В терапевтических дозах не обладает мутагенным, сенсибилизирующим, эмбриотоксическим и тератогенным действием.

ПОКАЗАНИЯ:

Иммунопаразитан применяют для лечения и профилактики эхинококкоза, ценуроза, фасциоллёза, дикроцелиоза, гиподерматоза, демодекоза, эдемагеноза, саркоптоза и других (внутренних) паразитарных заболеваний у сельскохозяйственных, мелких домашних и диких животных. Может быть эффективен при лечении и профилактике грибковых заболеваний.

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед использованием, препарат необходимо встряхнуть. Препарат вводят внутримышечно. Сельскохозяйственным животным - лошадям, крупному и мелкому рогатому скоту при саркоптоидозах, демодекозе, гиподермотозе, фасциоллёзе, ценурозе и при эхинококкозе делают 3 инъекции с интервалом между ними 5-7 дней (с учетом тяжести инвазии) в зависимости от массы животного в возрастающих нижеуказанных дозах:

Порядковый номер инъекции	Масса животного (кг) / Доза инъекции (мл)					
	до 2 кг	2-5 кг	5-10 кг	10-50 кг	50-100 кг	более 100 кг
1	0,2	0,4	0,6	1,0	1,5	2,0
2	0,4	0,6	0,8	1,2	2,0	2,5
3	0,6	0,8	1,0	1,5	2,5	3,0

Обработку против фасциоллёза проводят в период с января по апрель, против гиподерматоза - в конце августа и сентября. Для профилактики саркоптоидозов, демодекоза, гиподерматоза, эхинококкоза и фасциолёза у сельскохозяйственных животных препарат вводят двукратно интервалом между инъекциями 14-15 дней. Мелким домашним животным - собакам и кошкам в терапевтических целях при эхинококкозе, демодекозе, саркоптозе, нотоэдрозе делают 3-4 инъекций с интервалом между ними 4-5 дней (с учетом тяжести инвазии). В случае обширных поражений рекомендуется уменьшить дозу в 2 раза, а количество инъекций увеличить на одну (при этом интервал между инъекциями не изменяется и остается 4-5 дней).

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

У гиперчувствительных животных возможны аллергические реакции. При правильном использовании и дозировке побочные явления, как правило, не наблюдаются.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Сроки убоя сельскохозяйственных животных на мясо после применения Иммунопаразитана не ограничиваются. При систематическом применении Иммунопаразитана в течении 2-4 лет возможно резкое снижение паразитарной инвазии в очаге.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом, защищённом от света и недоступном для детей и животных месте при температуре от +2 °C до +20 °C (не замораживать).

Срок годности-2 года.

Производитель: СП ООО "BIBINOR"

Ташкентский р-й, г, Келес, ул Фитрат-2А.

Тел: +998995203040

Веб-сайт: www.bibinor.com

Произведено в Узбекистане



BIBINOR
Pharmaceuticals
SINCE 1999