

ФЛОРАБАЛАНС

Ветеринария препарати. Пробиотик.

Ич кетишга қарши ва модда алмашинувини яхшилаш учун қўлланиладиган восита. Сут-кислота бактериялари микроорганизмларининг манбаи ҳисобланади. Ичак микрофлорасини қўллаб-қувватлаш, фойдали бактериялар мувозанатини сақлаш ҳамда патоген бактериялардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Ҳазми яхшилайти: оқсиллар, ёғлар ва углеводларни парчаланишини оширади, иммунитетни мустаҳкамлайди ва ичкадаги яллиғланишни камайтиради.

ТАРКИБИ ВА ЧИҚАРИЛИШ ШАКЛИ

Леофил қуритилган пробиотик маданиятлар комплекси: Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacillus ва Enterococcus faecium гуруҳлари:

1 грамм порошокда 1×10^9 КОЕ (1 миллиард) дан ортик;
1 саше (пакетча)да 1×10^{10} КОЕ (10 миллиард) дан ортик.

Чиқарилиш шакли: порошок, саше ва капсулалар.

Қўллаш учун кўрсатмалар

- Ичак микрофлорасини нормаллаштириш учун;
- ҳазм бузилишларида;
- ўткир ичак инфекцияларида;
- дисбактериознинг турли шаклларида;
- диареяда;
- антибиотиклар қабул қилиш вақтида ёки ундан кейин;
- озиқ-овқатдан заҳарланишда;
- аллергияни комплекс даволашда.

ПАРРАНДАЛАР УЧУН Қўллаш

1. Ичимлик суви орқали

Дастлабки 7 кун:

ҳар куни сувга қўшиб берилади;
дозаси: 1 грамм 3–5 литр сувга (ёки 1 саше 30–50 литр сувга);
сув ҳарорати: 25–30°C.

7 кундан кейин:

профилактика учун ҳафтасига 2–3 марта;
стресс ҳолатларида (ташиш, вакцинация, об-ҳаво ўзгариши) қўшимча берилади.

2. Озуққа орқали

1 грамм 1,5–2,5 кг озуққага (ёки 1 саше 15–25 кг озуққага);
озуққа қуруқ ёки енгил намланган бўлиши керак.

Ёшга қараб:

жўжаларга — туғилган кунларидан бошлаб мунтазам;
катта паррандаларга — профилактика учун ҳафтасига 2–3 марта.

ЧОРВА МОЛЛАРИ УЧУН

Қўллаш усули: оғиз орқали, озуққа ёки сув билан, кунига 1 марта (5–10 кун давомида):

ҚРС (катта моллар): 20–30 г ёки 2–3 саше;

Бузоқлар: 10–20 г ёки 1–2 саше;

ҚҚМ (қўй ва эчкилар): 10–20 г ёки 1–2 саше;

Янги туғилган қўй ва эчкилар: 10 г ёки 1 саше.

НОЖУЯ ТАЪСИРЛАР

Тўғри қўлланганда одатда кузатилмайди. Ҳайвонда юқори сезувчанлик бўлса ва аллергия реакциялар пайдо бўлса, препаратни қўллаш тўхтатилади. Зарур ҳолларда антигистамин ва симптоматик даво воситалари қўлланилади.

ҚАРШИ КўРСАТМАЛАР

Препарат компонентларига индивидуал тоқатсизлик.

Гўшт ва сут учун чекловлар йўқ.

САҚЛАШ ШАРОИТЛАРИ

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, +2°C дан +25°C гача ҳароратда сақлансин. Яроқлилиқ муддати: 2 йил.

Тавсия этувчи компаниялар: SAXOVAT BROILER ва JIZZAX ORGANIC

Ишлаб чиқарувчи: МЧЖ “BIBINOR” ҚҚ

Тошкент тумани, Келес шаҳри, Фитрат-2А.

Тел: +998995203040

Веб-сайт: www.bibinor.com

Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган

(Америка технологиялари асосида)



BIBINOR
Pharmaceuticals
SINCE 1999

ФЛОРАБАЛАНС

Ветеринарный препарат. Пробиотик. Антидиарейный препарат и для улучшения обмена веществ. Источник микроорганизмов кисломолочных бактерий. Для поддержки кишечной микрофлоры и баланса полезных бактерий в пищеварительном тракте, а также для защиты от патогенных бактерий. Для улучшения пищеварения: повышение расщепления белков, жиров и углеводов, укрепление иммунитета и снижение воспаления в кишечнике.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Комплекс лиофильно высушенных пробиотических культур: групп Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacillus и Enterococcus faecium:

- более 1×10^9 КОЕ (1 миллиард) в 1 грамме порошка;
- более 1×10^{10} КОЕ (10 миллиардов) в 1 саше (пакетике). Форма выпуска: порошки, саше и капсулы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Для нормализации микрофлоры кишечника;
- при расстройствах пищеварения;
- при острых кишечных инфекциях;
- при различных формах дисбактериоза;
- при диарее;
- во время или после антибиотикотерапии;
- при пищевых отравлениях;
- в комплексном лечении аллергии.

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПТИЦЫ:

Методы применения пробиотиков:

1. Через питьевую воду

Первые 7 дней:

- Пробиотик рекомендуется добавлять в питьевую воду ежедневно.
- Дозировка: 1 грамм на 3-5 литров воды (или 1 саше (пакет) на 30-50 литров воды).
- Температура воды должна быть 25–30°C.

После 7-го дня:

- Давать 2-3 раза в неделю в профилактических целях.
- Использовать дополнительно во время стрессов (транспортировка, вакцинация, изменение погоды).

2. Через корм

Добавлять в корм:

- Дозировка: 1 грамм пробиотика на 1,5–2,5 кг корма.
- (1 саше (пакет) пробиотика на 15–25 кг корма)
- Корм должен быть сухим или слегка увлажнённым.

Использование в зависимости от возраста:

- Для цыплят: регулярное применение с первых дней жизни.
- Взрослым птицам: в профилактических целях достаточно давать 2–3 раза в неделю.

ДЛЯ СКОТОВ:

Способ применения и дозы: перорально с кормом или водой 1 раз в день (в течение 5–10 дней):

- **КРС (взрослые):** 20–30 грамм сухого порошка или 2–3 саше (пакета) в сутки;
- **Телятам:** 10–20 грамм или 1–2 саше (пакета) в сутки;
- **МРС (овцы и козы):** 10–20 грамм или 1–2 саше (пакета) в сутки;
- **Новорождённым овцам и козам:** 10 грамм или 1 саше (пакет) в сутки.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

При правильном использовании и дозировке побочные явления, как правило, не наблюдаются. При повышенной чувствительности животного к препарату и появлении аллергических реакций использование препарата прекращают. При необходимости назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Сроки убоя сельскохозяйственных животных на мясо и молоко после применения не ограничиваются.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В сухом, защищённом от света месте при температуре от +2°C до +25°C.

Срок годности: 2 года.

Рекомендовано компаниями: SAXOVAT BROYLER и JIZZAX ORGANIC

Производитель: СП ООО "BIBINOR"

Ташкентский р-й, г. келес, ул Фитрат-2А.

Тел: +998995203040

Веб-сайт: www.bibinor.com

Произведено в Узбекистане



BIBINOR
Pharmaceuticals
SINCE 1999